



AMAZONER



Innehåll

Redaktören	1
Amazoner i det vilda	2
Undulatgruppen	4
Amazonensom familjemedlem	6
Poseidons dag i Haga	8
Att föda upp amazoner	10
Hönshjärna	12
Alingsås Smådjursmässa	13
Olika arter av amazon	18
Medlemsförmåner	28
Kommande Aktiviteter	28



Gulkindad amazon
Foto: Viktor Osberg

Redaktionen

Maria Ahlström
Alison Anderberg
Viveca Arvidsson
Rita Grandér
Christer Johansson
Lisbeth Rosén



Redaktören har ordet

Nu kör vi igång!

Det är med (lite) pirr i magen, ödmjukhet och en spänd förväntan som vi nu försöker oss på att utöka månadsbladet till att mer likna en tidning. Vi har lämpligt nog döpt den till Flygbladet, efter ett fyndigt förslag från Caroline Utkovic. Vi kommer att ge en återblick i ord och bild på några av föreningens senaste aktiviteter, förhoppningsvis också olika artiklar som kan vara intressanta. Alla i föreningen som tycker om att skriva eller har något du vill förmedla, är mer än välkommen. Det är bara att höra av sig till redaktionen@gbfhobby.se. Du kanske har varit på en spännande resa, eller ett besök hos någon fågeluppfödare som du vill berätta om. Vi vill gärna ta del av det som du tycker är intressant och viktigt, det blir en inspirationskälla för oss andra i föreningen.

Att ha en föreningstidning är en idé som några av oss haft i tankarna ett antal år. I Danmark har varje förening en egen tidning, förutom Dansk Fugelhold, som är deras motsvarighet till vår Fågelhobby. Så varför skulle inte vi kunna ha det?

Vi mjukstartar med 4 nummer per år, 2 på våren och två på hösten. Nästa Flygblad kommer i december månad.

Den danske filosofen Søren Kirkegaard sa: "Att våga är att tappa fotfästet ett tag. Att inte våga är att förlora sig själv". Nu slänger vi oss ut i det okända för att starta upp detta projekt och hoppas att det kommer att falla i god jord och bli uppskattat.

Vi har haft en alldeles fantastisk sommar i år beträffande väderleken. En hel del fåglar har kläcks inte bara ute i naturen utan även i våra uppfödarens holkar, vilket är spännande och kul.

När jag skriver detta så har september bara börjat och i slutet av denna månad är det förbundsmöte, fågelhobbys årsmöte. Det hålls i år i Jönköping. Helgen börjar med KM för utställningsundulater på lördagen, för att sedan fortsätta på söndagen med förbundsmötet. Vi är inbjudna att vara med på bedömningen av utställningsundulaterna som startar kl.08.00 på lördag morgon. Jag ser denna möjlighet att få vara med som en fantastisk chans. Bilen startar för avfärd tidigt i ottan, 05.30 på lördag från Göteborg mot Jönköping. För en ytterst morgontrött person som jag, är detta att få vara med domarna, det som får mig att kliva upp i arla morgonstund och lämna min varma sköna säng, när jag dessutom är ledig, värd att utsätta sig för.

Under sommaren har jag roat mig med att läsa i gamla årsböcker från 1997 och 1998 som är i föreningens ägo. Det är verkligen roligt att bläddra igenom dem, där finns fotografier på fågelfolk som är aktiva ännu idag. Då lite yngre och inte så gråhåriga förstås. Det som slår mig är att även om hobbyn har utvecklats på flera sätt så är många av diskussionsämnena och frågeställningarna de samma som idag. En artikel av Agneta Jernberg, SBF, handlade om att tillverka fågelleksaker. En annan var skriven av en veterinär om vikten av att utfodra sina fåglar rätt för att hålla dem friska. Det fanns då som nu en framtidsgrupp som skulle diskutera fågelhobbys framtid. En hel del artiklar handlade om artbeskrivningar och dess uppfödningar. Såklart fanns det även med information om förbundsmötet som hölls i Malmö tillsammans med SM. Det var succé! Skrev Ingemar Hammarström, BDF. Hans Anderssons rödsidade lorier, från GBF fick priset "best in show".

Förbundsmötet då, ja Ingemar skrev att det var lugnt men att det ändå tog fyra timmar. Vid det tillfället var 20 föreningar representerade.

Nu önskar jag er en liten stund av trevlig läsning.

Mycket nöje,
Rita Grandér

Gulnackad & gulkindad amazon

Foto: Håkan Anderberg



Amazoner i det vilda

Amazonerna lever i topp- och mellanskikten i såväl regnskogar som glesare skogar, även i stäpp- och bergsområden, i Syd- och Mellanamerika men även på öarna i Västindien. Regnskogens jordlager är väldigt tunt. Allt som faller ner måste snabbt brytas ner, för att fort komma tillbaka i form av näring till växtligheten. Värmen och fukten hjälper till med

detta, men också amazonerna. De finfördelar växtligheten när de gnager. I viss mån kan man kalla dem för regnskogens avfalls-kvarnar. I de flesta fall är amazonen grön på kroppen (kejsaramazonen är det tydligaste undantaget) med färgmarkeringar på huvudet och vingarna. Vingarna är

ganska trubbiga och stjärten kort till mellankort. Stjärtfjädrarna är spektakulära när man ser dem, men de är oftast dolda under gröna täckfjädrar. Den gröna färgen gör att papegojorna smälter väl in bland träden. De kan ställa till stor förödelse för odlare, vilket gör att de jagas till utrotningsgräns.

Många av arterna ligger också illa till i det vilda. Förutom människor kommer den största faran från rovfåglar. De är bytesdjur, det ser man på att ögonen sitter på sidan av huvudet (det ger ett synfält på nästan trehundra-sextio grader) – och på skyddsfärgen – och de håller ständigt koll på vad som händer uppåt. De litar till sin syn för att klara sig från faror och kommunicerar med både kroppssignaler och direkt ögonkontakt. De undviker att hamna på marken utan håller sig i träden.

Varningslätet de använder är tydligt och lätt att uppfatta, men verkar vara bortglömt av fåglar som är uppfödda av människor sedan generationer. Amazoner flyger mest kortare sträckor mellan träden för att hitta föda. Därför flyger de inte bra, detta kan man se på de knubbiga vingarna och den relativt korta stjärten. Däremot är de desto skickligare på att klättra. Amazoner lever i livslånga par men går ihop i flockar, ibland på flera hundra fåglar. Paren lever tjugo-fyra timmar ihop: sover ihop, letar föda ihop och

putsar varandra. Undantaget är när honan ruvar på ägg. Amazoner, som andra fåglar, låter en hel del, speciellt på morgonen, när solen går upp, och kvällen, när solen går ner. Vilda papegojor biter inte varandra blodiga. De är experter på att läsa varandras kroppsspråk och undviker, på så sätt, konfrontationer. Om dispyter trots allt inträffar, är det oftast bohålor det handlar om.

- Maria Ahlström



Foto: Håkan Anderberg

Undulatgruppen



Photo: Anna-Lena Pettersson

I slutet av 2013 så bestämdes det av Lisbeth, Britt och Dan att GBF skulle behöva starta en undulatgrupp, då det kommit till så många undulatägare och undulater i föreningen.

Det bestämdes att Lisbeth, (Bettan) skall ansvara för den.



Photo: Viktor Osberg

Sagt och gjort... Lisbeth var på direkt och kontaktade några hon visste hade undulater och dom flesta nappade på att vara med, några på håll och några nära eller i Göteborgs-området.

Gruppen hade sitt första möte den 25:e januari 2014 hemma hos Lisbeth och därefter så har det varit 4 stycken till, hemma

hos dom olika medlemmarna.

Och det är det sista mötet vi hade för terminen, hemma hos Helena, som jag skall skriva om här.



En halvljummen dag med en halvmulen himmel, så styrde vi kosan mot Rävlanda och hem till våran medlem Helena Hurdén, en av föreningens undulatuppfödare, för att umgås, se på en massa undulater och undulater och grilla!

Vi anlände klockan 13.00 där vi mottogs av Helenas sambo Kåre, och blev inbjudna på kaffe och nybakad morotskaka, egengjord av Helenas son Anton!



Där satt vi en stund och diskuterade mycket kring GBF och även undulater. Lite senare gick vi ner till undulathuset, där det fanns en si så där 20-30


undulater och 4 nymf-kakaduor, 2 ordentliga voljärer och ett par häckburar med ungar i. Vi fotade och fick hålla någon av ungarna och alla var vi alldeles lyriska av dessa små varelser, som snart var färdiga att flytta hemifrån.

När vi tittat oss mätta på dessa underbara undulater, så visade oss Kåre, oss runt på tomten, som var en si så där 10 000 kvadratmeter!



Där fanns det kaktusar!, små dammar på olika ställen i trädgården med guldfiskar och grodor i, små bersåer, där man kunde sitta och filosofera i och en härlig gräsmatta att rumla runt på. Rena rama Botaniska Trädgården... Där fanns även 3 hundar och 3-4 katter.

Och när vi då gått runt allt detta, så var det dags att grilla.



Alla hade tagit med sig det dom ville grilla, men Helena bjöd på nybakade baquetter, smör och ost, tzatsiki, potatissallad och dryck. Allt smakade väldigt gott. Kaffe på maten fick vi också.

Vi hade otroligt tur med vädret och efter 4 timmar i en härlig miljö så styrde vi kosan hem igen.

Vi som var där var Linn, Britt, Rita och Bettan. Tusen tack till er, Helena och Kåre, för att vi fick komma och vara med om denna fantastiska dag. Hoppas på en repris...

- Lisbeth Rosén



Alla foto av Lisbeth Rosén

Amazonen som familjemedlem



Amazonen är bland den vanligaste stora papegojan som hobbyfågel. De trivs fortfarande med mycket växter runt omkring sig – luftfuktigheten bör vara hög – och med ljudet av rinnande vatten. De behöver tillfälle att flyga (givetvis) och att klättra. De är, som redan nämnts, högljudda, särskilt morgon och kväll, då de hälsar omgivningen godmorgon och godkväll. Det kliar ständigt i näbben på en amazon, så det behövs pinnar och annat att bita på. Alltså smutsar de ner en hel del.

De är energiska, sociala, intelligenta och hejdlöst uppfinningsrika. De lever länge, mellan 30–70 år, olika för olika arter. Vissa lär sig prata bra, andra inte. Det är väldigt individuellt men beror också på skillnader arterna emellan. Generellt brukar man säga att den gulnackade amazonen lär sig prata lätt och att venezuelaamazonen inte lär sig. Själv har jag personliga erfarenheter som är tvärtom. Sättet som amazoner lever i det vilda påverkar hur de reagerar som hobbyfågel. Till exempel

så lever en amazon aldrig ensam. En ensam amazon är en olycklig amazon och en olycklig amazon blir snart en skrikig amazon med en mängd olater. Det bästa är att ha två stycken eller att se till att den har mänskligt sällskap större delen av dagen.

Att papegojor skriker är naturligt men de skriker mest på morgon och kväll. Känner de sig ensamma så skriker de för att få uppmärksamhet och kontakt – de vill veta var du är. Att lära sig ett annat ljud som kontaktförsök är ett sätt att lösa prob-lemet. Men detta är inte ett sätt att

lösa problemet med en ensam fågel. Där finns bara ett sätt: se till att fågeln inte är så ensam. Eftersom amazoner lever i fuktiga miljöer så behöver de regelbundna duschar. Får de inte fukt så kan de få problem med andningsorganen och fjädrarna. I det vilda tar jakten på mat den största delen av dagen. Amazoner behöver inte flyga långt för att äta, men de klättrar desto mer. I och med att de inte flyger så mycket så lägger amazoner lätt på sig vikt. Alltså ska de inte få fet mat, tex solrosfrön och nötter. Tyvärr är de fågelvärldens värstingar när det gäller godis. Där får du som sambo/ägare hålla igen, eftersom de lätt blir feta. En bra kvalitet på papegoj-blandning eller bra pellets är bra som grundstomme.



Foto: Viktor Osberg

Dessutom måste man ge frukt och grönt dagligen. Man bör variera vad för frukt och grönt man ger, så fågeln får variation. Att gömma maten ger fågeln något att göra under

dagen. Vitaminer och kalk är bra att skjuta till. Dagsljuslampa bör man ha också. Utan dagsljus tar inte gojan upp kalk vilket leder till svagt skelett. Då amazoner är bytesdjur behöver de en bur/voljär där de kan känna sig trygga men inte isolerade. Då de är livliga fåglar behöver de få röra sig fritt utanför buren varje dag, under översikt, förstås(uppfinningsrika!). Sätt gärna upp leksaker utanför buren, så gojan har en egen sittplats i rummet. Platser att klättra på är också bra, både i och utanför buren. Dessutom behöver amazonen leksaker och grenar m.m. att gnaga på. Man får ha uppsyn på sin goja hela tiden för annars kan elsladdar och trädetaljerna i inredningen gnagas upp.

Det är ingen bra idé att skaffa en amazon om du inte har tid. De behöver mycket kärlek och uppmärksamhet och kan bli mycket svartsjuk om den tycker att någon har kommit emellan den och dess ägare. En sviken goja kan ha svårt att lita på någon.

Eftersom amazoner är livliga och intelligenta är det bra att försöka träna dem, de kan lära sig mycket och tycker oftast att det är roligt att lära in nya saker.

Flockdjur lär sig snabbt att läsa kroppsspråk och att samarbeta.



Detta gör papegojor, som ju lever i flock, till experter på att avläsa sin omgivning. Amazoner är empatiska och känner av omgivningens stämning mycket bra. Ge akt på ditt eget kroppsspråk och ditt eget humör – din goja gör det. Är du stressad blir din goja stressad. Utgå alltid från att din amazon förstår mer än du tror. För att undvika många problem bör du försöka lära dig att läsa din papegojas kroppsspråk.

Burstorleken följer storleken enligt L80:s mått. Till de minsta arterna räcker det med en bur med måtten 120:70:90, men till de flesta arterna behöver man en bur med måtten 160:90:100.

- Maria Ahlström & Dan Svensson

Blåpannad
& Equador-
amazon
Foto:
Rebecka
Johansson



Poseidons dag i Haga

Eftersom vår medverkan på Guldhedens dag på Dr Fries torg, blev en succé och varit så uppskattat från både bostadsbolagen, de boende i området och besökarna, har GBF ytterligare fått förfrågningar. Den här gången var det Poseidon som skulle ha ett "jippo" i Haga på en utav deras gårdar. Evenemanget

skulle starta kl 11.00. Vi hade blivit tillsagda att vara där en timma innan öppnande, för att hinna med uppackning och iordningställande, vilket var en utmaning för mig, då jag något trött, efter att ha suttit uppe sent och tittat när Holland form-ligen krossade Spanien med 5-1. Ett idrottsfan som jag var naturligtvis

tvungen att se även de övriga matcherna på ett av sommarens roligaste sportevenemang, VM i fotboll.



Även den här gången bjöds det på förtäring för både stora och små. Grillad eller kokt korv, kaffe, festis och godis.



Kunnandet är minst sagt varierande.

En del frågar vad det är för fåglar och när de får veta att den gröna är en amazon, av "märket" gulnackad amazon, händer det att en del frågar om de två övriga vita och den blågula fågeln vi har med är papegojor. Det visar ju att det är så viktigt att ta vara på dessa

tillfällen som ges och informera om vår hobby. Det är också jättekul när två gästande Australiensare från Mellbourn kommer fram till mina två triton och säger att kakaduer är jättepulära i storstäderna, till skillnad från jordbrukarnas erfarenheter där de går hårt åt skördarna i Australien.

- Rita Grandér

Det här är ett jättebra tillfälle för oss i GBF att göra reklam för oss, visa upp våra fåglar, informera och berätta om en god fågelhållning, regler, hållande, foder och mycket mer. Vi får alltid många frågor och många som är intresserade.



Alla foto av Rita Grandér

Att föda upp amazoner



För att häcka amazoner framgångsrikt behöver man givetvis två fåglar av samma art men olika kön. Det är väldigt olika hur paren går ihop, ibland klickar det direkt, ibland kan det ta flera månader tills fåglarna kommer överens. Ibland går det inte alls. Det handlar mycket om tur här.

Under häckningen är amazonen, speciellt hanen, mycket revirhävdande och aggressiv. (Alla amazoner blir mer aggressiva men det skiljer sig stort mellan arterna, där gulnackade får anses vara amazonsläktets

värstingar.) Därför är det en fördel med voljärer som har hela väggar, så de inte ser varandra men ändå hör andra fåglar. Att ha småfåglar i närheten stör dock inte.

Bona bygger de i trädhålor. I voljären använder man en holk, en bra storlek är 35 cm x 35 cm, med en höjd på 60 cm. Som bomaterial kan man använda hyvelspån.

För att få paret häckvilligt behöver man ge det mer protein än vanligt. Att ge äggfoder som man berikar ytterligare med kokt ägg eller kokt kycklingkött är bra. Man kan också ge

foder för insektsätare.

Dessutom mycket frukt, bär och grönsaker.

Fåglarna får samma foder under ruvning och uppmatningen. Viktigt dock att trappa upp successivt och även trappa ner successivt efter häckningen. Ett tecken på att det är dags för häckning är att hanen gör sig till och spelar för honan. Ett annat, kanske helt eget för Dans fåglar, tecken är också att hanen går ner på botten och äter sand.

De brukar lägga 2–5 vita ägg som ruvas i ca 28



dagar. Antalet ungar varierar stort från par till par, det finns många par som lägger blanka ägg. Detta får nog anses vara det vanligaste

problemet. Tyvärr finns också problemet med att föräldrafågarna äter sina ägg och till och med sina ungar. Ungarna lämnar boet efter 10–11 veckor,

men matas av föräldrarna i fyra veckor till. Här gäller det att se till att det finns gott om mat, viktigt att det är mat som föräldrarna gillar. De går inte bra med vad som helst. Från 15 juli 2014 är det förbjudet med handupp-födning, så föräldrarna tar själva hand om ungarna. Ungarna brukar ringmärkas när de är mellan tolv till arton dagar gamla.

- Maria Ahlström,
Dan Svensson &
Håkan Kronholm



Alla foto av Peder Jonsson

Hönshjärna har fått en ny betydelse

I en engelsk studie från 2007 (1), jämförde man 319 populationer och 236 olika arter av fåglar från



en tidigare undersökning (2). Studien visade att papegojor har de allra största hjärnorna i förhållande till kroppstorlek. I studien föreslog man att storleken kan vara en bra hjälp för en bättre överlevnadsstrategi. Orsaken trodde man kan bero på att djur med större hjärna, är bättre rustade att hantera olika förändringar i miljön som ex. vid klimat-förändringar, men också när fåglarnas naturliga habitat förstörs av olika anledningar.

De fågelarter som har den minsta hjärnan i förhållande till kroppstorlek var hönsfåglar och den allra minsta hade stäpphönsen (2).

2. Lefebvre, L., Reader, S. M. & Sol, D. 2004. *Brains, innovations and evolution in birds and primates*. Brain, Behavior and Evolution **63**, 233-246

Referenser

- Rita Grandér

1. Sol D, Székely T, Liker A, Lefebvre L. 2007. *Big-brained birds survive better in nature*. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, **274**, 763–769



Agria 
Djurförsäkring

10% rabatt på fågelförsäkring
för alla GBF medlemmar.
Kontakta info@gbfhobby.se
för medlemsnummer

Alingsås Smådjursmässa



Hans Karlssons Rubino Rosellor



En av de roligaste återkommande evenemangen som vi är med på, sker mitt i sommaren under industri-semesteren. Det är små-djursmässan i Alingsås, i Nollhagas ishall. Jag vet inte hur många år som vi varit med men det har blivit en kär tradition. Dessutom firade utställningen 50 år. Varje år har vi voljärer med fåglar och utanför sitter tamfåglar som besökarna kan titta närmare på. Några av dem är väldigt tack-samma för uppmärksamheten, eftersom det innebär lite extra kliande. I år hade vi fler arter än vi har haft tidigare. Bland annat var där Katarinaparakiter, undulater, nymf-kakaduor, silvernabbar, rubino rosellor etc.

Förberedelserna började redan med iordningställandet av voljärerna på torsdagen. Som vanligt var det ett tappert glatt gäng som hjälptes åt. Dan hade varit ute i skogen och hämtat kvistar och införskaffat burbottematerial. Det är mer förberedelse än man tror att sätta upp en liten utställning som det här väl nog kan räknas till. Allt runt om kring, smått och gott höll naturligtvis Bettan, Lin, Ida, Anna och Maria koll på. Folke fixade med belysning och el. Sedan satte det igång på fredagen. Då skulle alla voljärer vara klara och bebodda med de tillfälliga invånarna. I år var vi ganska många som var på plats och vi kunde avlösa varandra. Alla var fullt sysselsatta med att tala med besök-

are både utanför och inne i vårt område.

På fredagen kom några av våra långväga medlemmar från Öster-götland och hälsade på. Ludde tog tåget ner från Stockholm för att visa sina silver--nabbar och förhoppningsvis få några sålda. Sedan kom naturligtvis många av GBF-arna som bor i närheten dit. En del hade med sig sina fåglar. Ett tag hade vi ett 10-tal stora papegojor på plats.

Det var dock lite oroligt och skakigt om det skulle bli någon medverkan i år.



Det hade tornat upp sig mörka moln i horisonten. Den fruktade Newcastle-sjukan hade brutit ut på en gård i Östergötland, oturligt nog lagom till den här helgen. Vi följde noga utvecklingen och när både länsveterinären för Västra Götaland och Jordbruksverket gett oss klartecken att det inte var någon fara för oss, kändes vi oss ganska lugna.

Hönsfåglarna som skulle ställas ut, kom från Alingsås och hade dessutom inte varit i kontakt med något österut.

Varje dag under dessa tre dagar hade vår fantastiska Rebecka fågelshow, berättade om skötsel och hur man tränar fåglar. Fåglar gör ju inte alltid som man önskar när vi vill och det visade minsann de prov på.

Att vår monter drog till sig många besökare och fågelintresserade var det inget tvivel om. Är man djurägare av något slag så är det påfallande ofta som det även innefattar fåglar. Antingen har man haft fåglar, eller tänker skaffa, eller så har man fåglar hemma. Många av frågorna handlar om foder och allmän skötsel.

Tyvärr var det lite färre besökare totalt i år än de föregående åren, men det kunde kanske bero på det

varma vädret. Många hade nog valt det svalkande strandlivet, istället för att gå in i en varm torrlagd ishall. Men det märkte inte vi så mycket av. Det fanns alltid nyfikna och intresserade runt vår avdelning. Lars Lundels Afrikanska silvernäbbar fann sig



ganska snabbt tillrätta i en av bordsvoljärerna som var uppställda. Likaså undulaterna.

Som jag skrev i ingressen är detta en smådjursutställning. Det innebär att här fanns en hel del andra djurarter också. Får och lam i en hage. Möss av olika slag och färger, hönsfåglar, till och med bin. Naturligtvis får jag inte glömma kaniner. Det är ju så, att kaninavelsförbundet har kaninutställning med tävlingar i kaninhoppning och bedömning av avelskaniner under de här dagarna. Rader med kaninburar stod uppställda i hallen.

På söndagseftermiddagen var det dags att packa ihop och städa. När man

är många går det relativt fort och man är rätt nöjd efter dessa tre dagar. Ett jätte stort tack till alla ni som var med och hjälpte till, men också till er som kom dit någon av dagarna. Utan er blev det inte så bra. Det är ovärderligt och vi har så kul.



Två av arangörerna värmer upp grillen. Snart serveras det grillade hamburgare med sallad och bröd.



Familjen Ahlström, Folke, Wiliam och Maria på lunchrast.



Några besökare som hade haft fåglar och funderade på det igen. På axeln sitter en av Rebeckas fåglar, Saga som är en morhuvad.



Sari Jareteg med kompis.



Maria vattnar en törstig Bebis.



Besök från Borås.



Miranda säger hej.



Mostafa Jalali med Gumman på Axeln och Miranda på pinnen. Gumman är Bengans från början och är 20 år.

Bettans fina undulater. De trivdes att sitta och iakta vad som hände runt omkring.



Vår sektion var full med besökare som ville titta och prata fågel.



En hungrig Bengan. Jag vet inte hur han ser ut här. Han ser skitkonstig ut. Pinnben och jättemage. Det blev en konstig kameravinkel!



Rebecka med tre av sina fyra fåglar.



Lars Lundells Afrikanska Silvernäbbar

lat: *Euodice cantans*

Artinfo:

Livslängd 6-8 år

Längd 10-13 cm

Antal ägg 4-6

Ruvningstid 12-14 dygn

Ingen könsskillnad

Går att hålla med andra finkar



Vår monter Folke, Julius,
besökare, Ida & Elvis



Ida & Julis



William & Maria har plockat lite hallon i buskarna utan-för hallen.



Felix som gillade att gotta sig i hallonsnåren.



Felix stökande i buskarna drog till sig intresserade besökare även utanför utställningshallen.



Alla arter är olika i temperament. Kackaduor är kända för att gilla kli och närhet. Här en

besökare som får chansen att kela med Java. Både fågel och besökare är nog lika glada. Det var första gången som den här kvinnan kommit i kontakt med en tam fågel.



En liten flicka får hålla i den blågula aran Felix.



Tripp, trapp, trull.



Bettan i tappert försök att mata en något udda fågel.



Britt ser fundersam ut.



Dan och Hans i samtal vid ihoppackningen av alla fåglar och saker.



Två trötta men nöjda herrar, Lars och Elvis, pustar ut en liten stund, efter att ha tagit ner voljärerna.



Dags för avresa hemåt Göteborg



- Rita Grandér

De olika arterna av amazon

Gulpannad amazon

Yellow-crowned Amazon Parrot

(*Amazona ochrocephala*)

Centrala Mexiko till södra Peru. 35cm (14–15 inches), cirka 50 år. Unga fåglar har övervägande grönt huvud med gula fläckar. Fläckarna sprider sig med åren till en gul krona. Området kring näsborrarna är svart och näbben mörkt grå. Irisen är orange. Fjädrarna i nacken är gröna, kantade med svart. Unga fåglar har mera markerade svarta kanter. God talare.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Gulhuvad

Foto: Folke Ahlström

Gulhuvad amazon

Double Yellow-headed Amazon Parrot

(*A. ochrocephala oratrix*)

Underart till Gulpannad A. Kallas ibland för Levaillant's Amazon eller Mexican double yellow-headed. Finns primärt i Mexiko och Belize. Ungefär 40 cm (15 inches), 70 år. Unga fåglar har övervägande grönt huvud med gula fläckar. Fläckarna sprider sig med åren till

ett gult huvud. Processen kan ta upp till 25 år. Irisen är orange, näbben vit. God talare.

Burmått (minst): 1,44 m², längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m

Panama amazon

Panama Yellow-fronted Amazon Parrot
(*A. ochrocephala panamensis*)
Underart till Yellow-crowned A.
Finns i norra Colombia och i Panama och är 30 cm (12 inches). Lik double yellow-headed. Unga fåglar har övervägande grönt huvud. Får gul panna, har en blåaktig lyster. Fläckvis röd på skuldrorna. Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Panama amazon
Foto: Peder Jonsson

Vitpannad amazon

White-fronted (Spectacled) Amazon Parrot
(*A. albifrons*)
Vanlig i Mexiko. 25 cm (10 inches). Pannan är vita. Hjässan är blå. Runt ögonen är fjädrarn röda. Fjädrarna på bröst och nacke är kantade med svart. Storleken på könen skiljer sig märkbart.
Burmått (minst): 0,45 m², längsta sida: 0,9 m, höjd: 0,6 m

Kubaamazon

Cuban Amazon Parrot
A. leucocephala
28–33 cm (11–13 inches).
Fjäderdräkten är övervägande grön. Bakre delen av nacken är blå. Kinderna, lores och delar av bröstet är röda. Örontäckarna är mörkt grå. Fjädrarna på övre delen av bröstet är markerade med svart. Livlig
Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m
Underarter till Kubaamazon:
Bahamaamazon (*A. leucocephala bahamensis*)
Caymanamazon (*A. leucocephala caymanensis*)
Mindre Caymanamazon (*A. leucocephala hesternae*)



Kubaamazon
Foto: Peder Jonsson

Gulnackad amazon

Yellow-naped Amazon Parrot
(*A. ochrocephala auropalliata*)
Underart till Yellow-crowned.
Känd för sin goda talförmåga och
trevliga sätt. Extremt lekfull.
Färgar ut efter något år men är
helt grön som ung. 35–38 cm
Burmått (minst): 1,44 m²,
längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m

Yucatánamazon (gultygglad)

Yellow-lored Amazon Parrot
(*A. xantholora*)
Sydöstra Mexiko och
Yucatanhalvön. 26 cm (10
inches). Pannan och hjässan är
vita.
Området runt ögonen är röda.
Benen är ljust grå. Unga fåglar
har blå panna som utvecklas
till vitt med tiden.
Burmått (minst): 0,84 m²,
längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Gulnackad amazon
Foto: Alison Anderberg

Gulvingad amazon

(*A. aestiva xanthopteryx*)
Underart till blåpannad amazon.
Venezuelaamazon
Orange-winged Amazon
(*A. amazonica*)
Delar av Brasilien, Venezuela,
Colombia och stora delar av
Peru. 31 cm (13 inches), cirka
50 år. Pannan är blå (isblå) med
gul fläck i mitten. Kinderna är
gula. Vingpennorna är blå
och svarta med orange
markeringar. Irisen är orangeröd,
näbben är grå. Markeringen runt
ögonen är grå och smälter väl in
med den blå pannan. Benen är
ljust grå. Livlig, dålig
talare.
Burmått (minst): 0,84 m²,
längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Gulvingad amazon
Foto: Folke Ahlström

Grönkindad amazon

Green-cheeked Amazon Parrot

(*A. viridigenalis*)

Kallas ofta för Mexican red-headed Amazon Parrot eller Red-crowned Amazon Parrot.

Begränsade områden i Mexiko. 31–35 cm (13 inches). Unga fåglar har röda fläckar på huvudet som sprider sig med tiden till att täcka större delen av huvudet. Näbben och irisen är gula. Vingpennorna är blåa och svarta, stänk av rött på de andra vingpennor. Relativt god talare men ändå bättre på att härma ljud. Tillgiven och lekfull.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Gulkindad amazon

Yellow-cheeked Amazon Parrot

(*A. autumnalis*)

Kallas ofta för the Red-lored Amazon Parrot eller Scarlet-lored Amazon Parrot. Mexiko och Brasilien. 34 cm (13,5 inches).

Fjädrarna i nacken och på kronan är kantade med svart.

Kronan är röd, kinderna gula. Irisen är orange och ögonen är färhållandeviss stora.

Försiktig och misstänksam i fångenskap.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Underarter till gulkindad amazon:

Salvins amazon (*A. autumnalis salvini*)

Diademamazon (*A. autumnalis diadema*)



Equadoramazon

Ecuadorian Amazon

(*A. autumnalis lilacina*)

Ecuador. Storlek och utseende som gulkindad amazon, men har en mer vinröd färg på kronan och kinderna är limegröna. Fick nyligen status som egen art



Rödryggad amazon

Festive Amazon Parrot eller Red-backed A.P.

(*A. festiva*)

35 cm (14 inches). Östra Ecuador, östra Peru och nordvästra Brasilien. Fjädrarna i nacken är kantade med svart. Kronan har en smält blå ton. Röd markering i pannan. Fjädrarnas bas är gulaktiga. Irisen är gulaktigt orange.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Underart till Rödryggad amazon:

Bodinis amazon (*A. festiva bodini*)

Blåkindad amazon

Dufresne's (Blue-cheeked) Amazon Parrot

(*A. dufresniana*)

34 cm. Har en blålila färgton på kinderna, delar av nacken och örontäckarna. Näbben är grå med en röd markering längs övernäbben. Benen är gråa. Orange vingpennor

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Haitiamazon

Salle's Amazon Parrot

(*A. ventralis*)

Kallas också San Domingo Amazon parrot eller Hispaniolan Amazon. Finns på ön Hispaniola (Haiti och Dominikanska republiken) och även några andra karibiska öar. 30 cm (12 inches). Pannan och främre delen av hjässan är vita. En stor svart fläck finns vid örontäckarna. Näbben, benen och fötterna har en rosa ton.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Finschs amazon

Lilac-crowned Amazon Parrot

(*A. finschi*)

Kallas också violettekronad amazon. Nordvästra Mexiko på ungefär 700 meters höjd. 33 cm (13 inches). Fjädrarna är kantade med svart. Pannan är rostfärgad, kronan går åt lila. De främsta vingpennorna är lila, de andra är gröna som går mot blått i ändarna. Irisen är orange men unga fåglar har brun iris, benen grå som drar åt grönt. Näbben är hornfärgad. Populärare i USA än i Europa även om den inte är vanlig där heller. Lite stillsammare.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Finschs amazon
Foto: Folke Ahlström

Tucumanamazon

Tucumán Amazon Parrot

(*A. tucumana*)

31 cm (12–13 inches). Sydöstra Bolivia. Ryggfjädrarna starkt markerade med svart. Pannan är röd. Första vingpennorna är gröna som skiftar mot blått i ändarna med röda inslag. Ögonen har en vit ring med orangegul iris och benen är grå med dragning mot rosa.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Tucumanamazon
Foto: Gösta Andersson

Praktamazon (Rödkronad)

Red-spectacled Amazon Parrot

(*A. pretrei*)

Sydöstra Brasilien. 32 cm (13 inches). Pannan är röd liksom området runt ögon och delar av axlarna. Vissa av fjädrarna på vingarna är också röda. Irisen är gul, näbben är hornfärgad. Mycket lik Tucumanamazonen. De skiljs åt av de röda inslagen på axlarna och runt ögonen.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Rödstjärtad amazon

Red-tailed Amazon Parrot

(*A. brasiliensis*)

Kallas också Brazilian green Amazon. Södra Brasilien. 35–37 cm (14 inches). Uppe på huvudet är rosaaktig. Kinderna strupen och övre delen av bröstet är gråaktiga med en dragning åt blått. De första vingpennorna är svarta och djupt blå. Stjärten har ett band av gult och ett band av rött. Irisen är brunorange och benen är grå.

Burmått (minst): 1,44 m², längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m

Vinröd amazon

Vinaceous Amazon Parrot
(*A. vinacea*)

Sydöstra Brasilien. 36 cm,(14 inches). Pannan och området mellan näbben och ögonen är röda. Den övre delen av bröstet är lila, ibland blå-grön. De främre vingpennorna är svarta och blå. Irisen är röd och benen är ljus grå.

Det lär vara en snäll papegoja.

Burmått (minst):1,44 m², längsta sida: 1,6 m, höjd: 1m

Soldatamazon

Scaly-naped Amazon Parrot
(*A. mercenaria*)

Återfinns ut efter kusten längs med Venezuela, Colombia, Bolivia, Peru och Chile. 34 cm.

Den kan identifieras på den gulaktiga fläcken på hjässan. Irisen är röd, näbben och benen är grå. Vingarna är huvudsakligen gröna men spetsade med rött.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Vinröd amazon
Foto: Folke Ahlström

Gulskuldrad amazon

Yellow-shouldered Amazon Parrot
(*A. barbadensis*)

Fanns huvudsakligen på ön Aruba, men är nu rapporterad utdöd där. 33 cm (13 inches).

Huvudet är vitaktigt gult. Vingpennorna är ganska mörka, från mörkt blå till svart.

Skuldrorna är ljus gula. Ögonen är mörkt orange, näbben ljus hornfärgat.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Kawalls amazon

(*A. kawalli*)

Liknar Mjölnamazonen men har klarare grön fjäderdräkt, vit hud vid näbbroten, relativt liten grå(ev. vit) ring runt ögonen och rött vid stjärtbasen. 36 cm.

Burmått(minst): 1,44 m², längsta sida: 1,6, höjd: 1 m

Mjölarnamazon

Mealy Amazon

(*A. farinosa*)

Venezuela, Guyana och större delen av Brasilien. 38-40 cm (15–16 inches), 50–70 år. Den är övervägande grön, området runt ögonen är skarpt tecknad med vitt. Ryggen och nacken har ofta en vitaktig beläggning, nästan som om den var pudrad med mjöl. Därav namnet. Gula inslag kan förekomma individuellt. Rent allmänt kan man säga att med stigande ålder förekommer det mer gult. Första vingpennorna är svarta med inslag av grönt och blått. Unga fåglar har brun iris, denna ändrar sig till rött när fågeln mognar.

Benen är ljusgrå.

Burmått (minst): 1,44 m², längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m

Underart till Mjölarnamazon:

Guatemalaamazon (*A. farinosa guatemalae*)

Granadaamazon

Red-browed Amazon Parrot

(*A. rhodocorytha*)

Atlantiskogarna i Östra Brasilien. 35 cm. Främre delen av pannan är röd. Kinderna är gul, mot det röda, och blå under det gula.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m



Mjölarnamazon
Foto: Peder Jonsson

St. Luciaamazon

St. Lucia Amazon Parrot

(*A. versicolor*)

Enbart på St. Luciaön på Små Antillerna. 40–43 cm (16–17 inches). Fjäderdräkten är olivgrön, fjädrarna är starkt markerade med svart. Övre delen av bröstet är rödfläckade, nedre delen av bröstet är mera gult i tonen. Näbben är mörk.

Burmått (minst): 1,44 m², längsta sida: 1,6, höjd: 1 m

St. Vincentamazon

St. Vincent Amazon Parrot

(*A. guildingii*)

Ön St. Vincent. 40–46 cm. Pannan och främre delen av hjässan, tillsammans med kinderna och örontäckarna, är vita. Hjässans fjädrar är kantade av lila. Nacken är blå och övre delen av bröstet är brun. Även de övre fjädrarna på stjärten är bruna. Irisen är orange och näbben är hornfärgad. Goda talare, om ej i Gulpannade amazoners klass.

Burmått (minst): 1,44 m², längsta sida: 1,6, höjd: 1 m

Blåhuvad amazon

Red-necked Amazon Parrot

(*A. arausiace*)

Även kallad rödhalsad amazon. Den finns enbart på Dominica i Små Antillerna. 41 cm (16 inches). Pannan, hjässan och kinderna är havsblå. Övre delen av nacken är röd liksom delar av det övre bröstet. De flesta fjädrarna är kantade med svart. Irisen är orange och näbben är rosatonad.

Burmått(minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6, höjd: 1 m


Blåpannad amazon

Blue-fronted Amazon Parrot

(*A. aestiva*)

Brasilien och Argentina. 37 cm (14–15 inches), 40–60 år. De är utfärgade när de lämnar boet. Pannan är blå (turkosblå). Områdena runt strupen, kinderna och runt ögonen är gula. Vingpennorna är blå och svarta med röda markeringar. Irisen är orange, näbben grå. Den vanligaste amazonen i Sverige. God talare.

Burmått (minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m



Blåpannad
Foto: Folke Ahlström

Kejsaramazon

Imperial Amazon

(*A. imperialis*)

Även kallad Kungsamazon. Finns enbart på Små Antillerna. 48 cm (19–20 inches). Huvudet, nacken, bröstet och buken lilablå med svarta kanter. Fjädrarna på hjässan och ner i nacken är kantade med mörkgrönt. Vingpennorna är mörkt lila med inslag av blått och grönt. Stjärten är röd eller rödbrun. Irisen är orange. Honan är klart större än hanen. Burmått(minst): 2,2 m2, längsta sida: 2,0, höjd: 1,2 m

Gulnäbbad amazon

Yellow-billed Amazon Parrot

(*A. collaria*)

Jamaica. 29 cm (11,5 inches). Den har en rosaröd ton på kinderna och strupen. Fjädrarna på hjässan och nacken är kantade med svart. Kroppen är grön med en ljusare grön på bröstet. Vingpennorna är mörkblå. Basen på stjärten är gul och rosa. Den lär vara högljudd och en dålig talare(The Duke of Bedford), till och med tråkig, i fångenskap.

Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Svartnäbbad amazon

Black-billed Amazon Parrot

(*A. agilis*)

Jamaica. 27 cm (10,5 inches). Den ska ha en vackrare grön fjäderdräkt än de andra amazonerna. Huvudet har en ljus grön färg men en blå ton på hjässan. Huvudets och nackens fjädrar är kantade med svart. Man kan ofta se en ljus fläck på övernäbben, näbben är gråsvart. Vingpennorna är svarta eller lilablå. Irisen är mörkt brun.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Puerto Ricoamazon

Puerto Rican Amazon Parrot

(*A. vittata*)

Finns enbart på Puerto Rico 30 cm (12 inches). Den har ett smalt band av rött på främre delen av huvudet. Fläckar av rött finns också vid kinderna och örontäckarna. Den yttersta delen av vingpennorna och stjärten är blå. Stjärten är gul längst ut, liksom iris och näbben. Markerad vit ögonrand. Rött ovanför övernäbben.

Burmått (minst): 0,84 m², längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m

Gulmaskad Amazon

Yellow-faced Amazon Parrot

(*Alipiopsitta xanthops*)

Anses inte längre som en äkta amazon. Flyttad till kortstjärtade (Short-tailed) papegojor.

- *Maria Ahlström & Dan Svensson*

Medlemsförmåner

Du glömmer väl inte att som medlem i Göteborgs fågelförening har du rabatt på allt möjligt smått och gott?

Vi är glada med att berätta att vi en av få fågelföreningar som har rabatt på Agrias fågelförsäkringar med 10%.

Hos FlexiPet har vi 10% på burar

15% rabatt hos Göteborgs Zoologiska på Kaggeledstorget 2

Dessutom 10% rabatt hos Zoo Center i Frölunda

Kommande aktiviteter

KM Undulatutställning i Jönköping

27 september

En undulatutställning där vi fått äran att vara med i bedömningen!

Undulatträff hos Anna-Lena

11 oktober kl 14:00

Här ska vi prata om undulatens oändliga färgkombinationer

Resa till Själland

19 oktober

Vi besöker olika ställen varav Køge är en av dem

Friflygning

19 oktober kl 13:00

Dags att rasta gojan!

Medlemsmöte

26 oktober kl 13:00

Josefina Persson har ett föredrag om Peru

Resa till Randers

8-9 november

Resan alla ser så mycket framemot

Uppfödarmöte

19 november kl 18:30

Denna gången ska vi prata om Aran

Friflygning + Undulatpyssel

23 november kl 13:00

Två grupper slåss ihop för att rasta sina gojor, men även pyssla ihop lite leksaker och presenter till våra små



Gulnackad amazon
Foto: Håkan Anderberg

© Håkan Anderberg

Medlemsmöte - JUL

7 december kl 13:00

Kom och fira lite jul med oss!